

腸管出血性大腸菌感染症の発生について

1 概要

令和8年8月24日 県内医療機関から福井市保健所に対し、患者から腸管出血性大腸菌O103及びベロ毒素を検出した旨、届出があり、患者の健康状態、行動等について調査を実施しました。

2 患者等の状況

- ① 患者 市内在住の方 20代女性 1人
主な症状：無症状

便検査		初診日
便検査開始	ベロ毒素確認	
8月18日	8月22日	

- ② 接触者なし

3 発生に伴う対応

福井市保健所において、下記の措置を実施しました。

- ① 本人の健康状態、行動及び喫食状況の調査
- ② 接触者の健康状態調査及び衛生教育
- ③ 消毒の指示

4 本市内における腸管出血性大腸菌感染症の発生状況

(令和8年8月24日現在本件含む)

		令和6年	令和7年 (全国は暫定値)	令和8年 (全国は8月24日 現在の暫定値)	参考 (昨年同期)
全国	届出数(人)	3,742	4,319	2,418	2,312
県	届出数(人)	8	13	28	4
市	届出数(人)	1	11	5	4
	有症者(人)	1	7	4	2
	無症者(人)	0	4	1	2

5 感染症予防について ※注意喚起をお願いします。

腸管出血性大腸菌感染症の予防について

感染を予防するには、各家庭において次の事項に留意することが大切です。また、腹痛や下痢、血便等の症状がある場合には調理等を行うことを控え、早めに医療機関を受診しましょう。

○感染予防には手洗いが最も重要です。特に調理や食事の前、用便後や便の始末をした際には十分に手を洗いましょう。

○調理器具は食品ごとにこまめに流水で洗い、熱湯等で消毒しましょう。

○生野菜は流水でよく洗い、肉類や加熱する食品は十分に加熱（中心部を75℃で1分間以上）しましょう。

→生食用の牛レバー及び豚肉（内臓を含む）は提供・販売されていません。

○焼肉をする場合は、生食専用の箸を用いるなど、箸の使い分けをしましょう。