

令和7年度 定期予防接種一覧 (こども家庭センター 担当)

※注1 接種期間・接種間隔:必ず守っていただきたい期間・間隔

※注2 標準的な接種期間・接種間隔:おすすめする期間・間隔

◎対象年齢・接種間隔等をご確認いただき、接種をお願いいたします。

予防接種の種類			回数	対象年齢	接種期間・接種間隔 ※注1		標準的な接種期間・接種間隔 ※注2		通知時期 ・ 備 考
5種混合 (4種混合+ヒブ)	1期	初回	3回	生後2か月～7歳6か月になる前日まで	20日以上の間隔をおいて3回		生後2～7か月に至るまでに開始し、 20～56日の間隔で接種		生後2か月になる月の上旬に、日本 脳炎と合わせて、6種類同時に通知 します。
		追加	1回		初回3回目終了後、6か月以上		初回3回目終了後、 6か月～1年6か月の間隔で接種		
小児用肺炎球菌 【初回接種開始生後2 ～7か月に至るまで (標準的な開始時期) の場合】	初回	3回	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで	2歳までに、27日以上の間隔で接種 ※1歳を超えて2回目の接種をした場合は、 3回目の接種は行わない。		1歳までに、 27日以上の間隔で接種			
	追加	1回		1歳以降で、初回接種として行った最後の接 種終了後、60日以上		1歳～1歳3か月までに、 初回接種として行った最後の接種終了後、60日以 上の間隔で接種			
BCG		1回	1歳の誕生日の前日まで	—		生後5～8か月までに接種			
B型肝炎		3回	生後12か月(1歳)になる前日まで	27日以上の間隔をおいて2回 さらに第1回目の注射から139日以上の間隔 をおいて1回接種		生後2～9か月に至るまでに接種			
ロタウイルス ※ワクチンの種類に よって2回または3回	ロタリッ ス(1価)	2回	生後24週0日まで	1価	27日以上の間隔をおいて2回	生後6週～24週0日までに接種			
	ロタテック (5価)	3回	生後32週0日まで	5価	27日以上の間隔をおいて3回	生後6週～32週0日までに接種			
4種混合 (ジフテリア、百日咳、破 傷風、ポリオ)	1期	初回	3回	生後2か月～7歳6か月になる前日まで	20日以上の間隔をおいて3回		生後2～12か月までに 20～56日の間隔で接種		—
		追加	1回		初回3回目終了後、6か月以上		初回3回目終了後、 1年～1年6か月の間隔で接種		
ヒブ 【初回接種開始生後2 ～7か月に至るまで (標準的な開始時期) の場合】	初回	3回	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで	1歳までに、27日(医師が必要と認めるときは 20日)以上の間隔で接種 ※1歳を超えたら行わない。		1歳までに、 27(医師が必要と認めるときは20日)～56日の間 隔で接種		—	
	追加	1回		初回3回目終了後、7か月以上 ※1歳までに初回3回を完了できなかった場 合、最後の接種から27日(医師が必要と認め るときは20日)以上の間隔で接種		初回3回目終了後、 7～13か月の間隔で接種			
麻しん風しん※1	1期	1回	1歳～2歳の誕生日の前日まで	—		—		1歳の誕生月の上旬に、水痘と同時 に通知します。	
	2期	1回	平成31年4月2日 ～令和2年4月1日生まれの者 (年長児)	—		《接種期間》 令和7年4月1日 ～令和8年3月31日		令和7年4月1日に一斉発送	
水痘		2回	1歳～3歳の誕生日の前日まで	3か月以上		1回目:1歳～1歳3か月までに接種 2回目:1回目終了後、6～12か月の 間隔で接種		1歳の誕生月の上旬に、麻しん風し ん1期と同時に通知します。	
不活化ポリオ	初回	3回	生後2か月～7歳6か月になる前日まで	20日以上		20～56日の間隔で接種		—	
	追加	1回		初回3回目終了後、6か月以上		初回3回目終了後、 1年～1年6か月の間隔で接種			

予防接種の種類			回数	対象年齢	接種期間・接種間隔 ※注1		標準的な接種期間・接種間隔 ※注2		通知時期 ・ 備 考	
日本脳炎	1期	初回	2回	生後6か月～7歳6か月になる前日まで	6日以上		3～4歳までに、6～28日の間隔で接種		生後2か月になる月の月上旬に予診票を送付 ◆接種量 3歳未満:0.25ml、 3歳以上:0.5ml	
		追加	1回		初回2回目終了後、6か月以上		初回2回目終了後、 おおむね1年の間隔で接種			
	2期		1回	9歳～13歳の誕生日の前日まで	—		—		9歳の誕生日月の翌月上旬	
	特例対象者 (H17. 4. 2 ～ H19. 4. 1生 まれの方)	1期	初回 相当	20歳の誕生日の前日まで	6日以上	【平成23年5月19日までに 1回以上接種済みの方】 残りの回数を6日以上の間 隔で接種できます	6～28日の間隔で接種		—	
			追加 相当		1回		初回2回目終了後、 6か月以上			
		2期		1回	9～20歳の誕生日の前日まで	1期終了後、6日以上		1期終了後、 5年の間隔をあけるのが望ましい		特例対象者で2期未接種の方には、 高校3年生の4月に予診票を発送済
2種混合 (3種混合)			2期	1回	11歳～13歳の誕生日の前日まで		—		11歳の誕生日月の翌月上旬	
子宮頸がん	2価		3回	●定期予防接種: 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 ●キャッチアップ接種終了後の経過措置 平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれ的女子で、令和4年～令和6年度に1回以上接種している者は、令和8年3月31日まで接種可能	1か月以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔で1回接種		1か月の間隔をおいて2回、1回目からの注射から6か月の間隔をおいて1回		13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間 (接種開始後1年以内に終了)	・平成25年4月2日～平成26年4月1日生 (小6年生)女子の方へ令和7年4月1日一斉発送 ・年度末年齢13歳以上の対象者には、通知済
	4価		3回		1か月以上の間隔で2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔で1回接種		2か月の間隔をおいて2回、1回目からの注射から6か月の間隔をおいて1回			
	9価	2回	15歳未満で1回以上接種 5か月以上の間隔をおいて2回 ※間隔が5か月未満の場合3回目接種が必要となる		15歳未満の場合2回接種で終了可能。 6か月の間隔をおいて2回					
		3回	15歳以上は3回接種。 1か月以上の間隔で2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔で1回接種		15歳以上は3回接種。 2か月の間隔をおいて2回、1回目からの注射から6か月の間隔をおいて1回					

※1 1期:令和4年4月2日～令和5年4月1日生まれの方
2期:令和6年度2期の対象者(平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ) 令和7年4月1日～令和9年3月31日まで公費で接種可能

■ヒブ、小児用肺炎球菌を7か月以降に接種開始した場合の接種方法

	接種開始時期	回数	接種間隔等		接種開始時期	回数	接種間隔等
ヒブ	生後7～12 か月に至るま で	初回2回	1歳までに、27日（医師が必要と認めるときは20日）以上の間隔で 接種（標準：27～56日の間隔） ※1歳を超えたら行わない。	小 児 用 肺 炎 球 菌	生後7～ 12か月 に至るま で	初回 2回	2歳までに、27日以上の間隔で接種（標準：1歳1か月までに） ※1歳を超えて2回目の接種をした場合は、3回目の接種は行わない。
		追加1回	初回2回目終了後、7か月以上（標準：7～13か月の間隔） ※1歳までに初回2回を完了できなかった場合、最後の接種から27 日（医師が必要と認めるときは20日）以上の間隔で接種			追加 1回	1歳以降で、初回接種として行った最後の接種終了後、60日以上 （標準：1歳～1歳3か月までに）
	1～5歳に至るまで：1回				1～2歳に至るまで：60日以上の間隔で2回 2～5歳に至るまで：1回		

<問合せ>
福井市こども家庭センター
TEL20-5337